



חמש הדריכים המרכזיות שמשקרים להורים ולציבור

הרחב בסרטוי תעמולת וספרי תעמולת של

אידיאולוגית המגדר

השער הכי גדול - כאילו ניתן בכלל לשנות מין. ביולוגית מעולם איש לא שינה את מינו. המין מופיע בכל תא ותא בגופינו ולא ניתן לשנות זאת. מה קורה רפואי? בגלל שהבלוקרים ולאחריהם ההורמוניים של המין השני ריעילים למערכת הפעלה של הגוף, התוצאות המצתירות הן גידול ניכר בסיכון להתקפי לב, שבצים, קרייסים, סרטן, מחלות אוטואימוניות, מחלות הורמונליות, אוסטאופרוזיס, אטרופיה של איברים פנימיים כולל מערכת הרבייה, ועוד - למשל, במחקר מאחרונה על נשים על טסטוסטטறון בגיל ממוצע של 28 במחקר, ל-94% מהם היו סימפטומים ברצפת האגן, ל-87% סימפטומים במערכת השתן ול-74% סימפטומים בעמידים כתוצאה מתסטוסטטறון. בغال ממוצע 28 שנים אוחזים מהם דלפו שtan ו/או צואה¹². מבחינה רפואי לא ניתן ליצור אבריו מין מתפקדים. הם לא רק לא מתפקדים, אלא יוצרים שורת נזקים בריאותיים. למשל לפי אחד מחקרים שליש מהגברים שעבורו כריתת איבר מין אייבדו שליטה בשתן, מעל שמונים אחוז מדווחים על כאבים חרוניים גם שנים אחרי. בשורה התחרתונה מחקרית נמצא קשר לקיורו משמעותי של תוחלת החיים כתוצאה מהטיסירוס הכימי וכריתת האברים⁴. גם חברות החבורה בפועל בוחרת בני זוג לפי המין המצווי, לא לפי המין הרצוי, התוצאה היא דיווחים על בידות והעדר קשרים זוגיים בקרוב רוב המבוגרים שעבורו השחתה של גופם מטעה מגדרית¹⁰. ילדים כמובן לא מבינים זאת ואינם בעלי יכולת להבין זאת ומאמינים בתמיינותם לשקרים של מבוגרים כאילו ניתן בכלל לשנות מין מלכתחילה.

1

השער שדיספוריה מגדרית זה מצב נדייר, מולד וקבוע. בפועל מחקרית נמצא שהרzon לשנות מין בקרב ילדים כלל לא נדייר. במחקר שפורסם ב-2024 מהולנד⁵, 19% מהילדים בני 11 אמרו שברצונם לשנות מין. המעקב בוצע ב-6 תחנות זמן עד גיל 26. הרzon לשנות מין נמצא בקורסציה לבטחון עצמי נמוך, להפרעות רגשיות או פסיכיאטוריות נוספות, ולנטיה מינית לבני מינם (נבחנה בגיל 22 של אותם ילדים). רוב הילדים שענו בחוויב על הרzon לשנות מין בילדות, בגיל 26 כבר לא חשו כך. למעשה 3 צעירים בלבד ענו בחוויב על השאלה על הרzon לשנות מין בכל 6 התחנות. כך נמצא גם בעבר החל משנות השבעים ועד היום במחקר דיספוריה מגדרית - בכל המחקרים רוב הילדים החלימו מדיספוריה מגדרית תוך מספר שנים - כ-80%. לעומת זאת אם עושים מעבר חזרתי (מעמידים פנים שהילד הוא בן המין השני ומושנים לשון פניה והצגה עצמית) תהליך זה נמצא מחקרים וקלינית פוגע אנושות בסיכוי ההחלמה מדיספוריה מגדרית⁸ (מ-80% ומעלה ההחלמה לאוחזים בודדים בלבד במחקר מאוחרונה⁹).

2

3

השער כאילו יש קונצנזוס מחייב שהטיפול הכى טוב בדיספוריה

אצל קטינים זה המודל ה"מאשש"- "טיפול מאשש/מאשר" אלו מילים מכובסות למעבר חברתי משמר דיספוריה, סיروس כימי וכירית אברים. בפועל שורת מדיניות באירופה שביצעו או הסתמכו על תחקיר עמוק של המחקר והמצאים הקליניים הגיעו למסקנה שאון וראיות שהთועלת עולה על הנזק, ושאין וראיות שזה מועיל לבリアות הנפש בטוחה הארוך.¹¹ עד כה בריטניה, שוודיה, פינלנד, נורבגיה, דנמרק, איטליה, גרמניה, צרפת הכריזו על שינוי מדיניות מהמודל המאשש למודל שבו מתייחסים לדיספוריה מגדרית כאל סימפטום ומציגים טיפול פסיכותרפי כמו בכל מצוקה נפשית אחרת. כמו כן המודל בוטל ונאסר בעשרות מדיניות באלה^{12,13}.

4

השער כאילו יש להורים שתי אפשרויות - או לתמוך באמונת הילד שהוא נולד ב"גוף לא נכון" שצורך ל"תקין" כלומר להסיל אותו לשירות כימי או כירית אברים, או להתנצל לו ולהזינה או להיות

אלימים כלפיו. לא רק שתי האפשרויות הללו הן לא היחידות, שתיהן מובילות להתעללות בילד. זה מופרך כמו שהוא אומרים לכם שכדי לתמוך בילד עם אונורקסיה צריך או להסביר אותה שהוא שמנה ולהסיל אותה לשאיית שוכן, או להתנצל ולהיות אלימים כלפיו. התמיכה הרואה היא להיות עבורה הילד עוגן למציאות בה לא ניתן לשנות מין, ולבדק עם הילד מה הסיבה האמיתית למצוקה ולהנגיש סיוע בהתאם. כדי שהורים יסכימו להסיל את ילדיהם לשירותים כימיים וכירית אברים משלקרים להם שיש סיכון אובדן גבוה לפני, שמצוצמים אחריו. הנתונים מושומות רפואיות (להבדיל מנתונים על בסיס סקרים אונוניים ולא דוגמה מייצגת ובReLU כשלים מתודולוגים מהאינטרנט) מראים את ההפק הגמור. סיכון אובדן נמוך לפני, שkopf מס' שנים אחרי השירותים והכיריות.^{1,2,3}

5

השער של מניפולציות שפטיות - כדי לקדם את השירותים והכיריות בקטינים מנסים לבצע מניפולציות על המציאות באמצעות מילים. קוראים לעידוד אנשיים להזדהות במין שונה מאשר מהמציאות ולתהליכי השחתת הגוף "האני האותנטי" ו"כפי שאינו". לסייע לצער להתגבר על המצוקה גשית ולקבל את גופו כפי שהוא הם קוראים "המרה". לשקרים לקטינים כאילו ניתן לשנות מין והסללים לשירותים כימיים וכירית אברים הם קוראים "תמיכה". אכפתיות לשולם של קטינים ובהתאם הטענות להסללים לשירותים כימיים וכירית אברים הם קוראים "שנהה והסתה".



כדי לתמוך בטענה שזה מziel חיים מבחינה נפשית (מבחינה פיזית הנתונים מראים קיצור תוחלת החיים) הינו צריכים להוכיח את הנקודות הבאות:

- 1. שיש התאבדויות גבוהות לפני.** בפועל המחבר מראה שההתאבדויות בפועל נדירות מאד¹ - 0.0003. במחקר הבריטי.
- 2. שההתאבדויות הן בגלל דיספוריה.** ביום יש בקרב הפונים למרפאות המגדר קו מרובידיות גבוהה מאד (כלומר, בנוסף לדיספוריה המגדרית יש לפחות מזוקות נוספות כמו חרדה, דיכאון, הפרעת אכילה, טראומה, הימצאות על הרץ האוטיסטי, הפרעת קשב וריכוז ועוד. מהנתונים בבריטניה ל-97.5% מהמטופים שפנו למרפאת המגדר היה מצב נלווה נוספת מלבד דיספוריה, ול-70% היו חמיisha מצבים נלווים לפחות), כך שיתכן שהאובדן היא תולדה של מצב נלווה ולא של הדיספוריה המגדרית, מה שמצויך טיפול במצב הנלווה, ולא סירוס וכירתה. בפועל נמצא במחקר עדכני שכשעושים בקרה על משתחנה הרקע הפסיכיאטרי הנלווה, אין הבדל בהתאבדויות בין אלו שיש להם ואין להם דיספוריה.²
- 3. שההתאבדויות קטנות אחרי הסירוסים והכניתות.** בפועל הממצאים שנלקחו מרשותות רפואיות מראים את ההפוך הגמור, שגם נסיוונות אובייניות שהובילו להגעה לביקור חירום במאיון פסיכיאטרי וגם התאבדויות בפועל מזנקים אחרי הסירוסים והכניתות.³
- 4. שהנזק לא עולה על התועלת** (אם זה היה מ Ziel A מהתאבדות בשנה אבל הובילו למותם של פי כמה וכמה בגין שתהיליכי השחתת הגוף מקפיצים את הסיכון להתקפי לב ולשבץ מאות אוחזים ומגדלים סיוכן גם לסרטן, סקרת, ועוד, אז הזקנו במקום להועיל).⁴
- 5. שהדיספוריה או הרצון להיות המין השני מצב קבוע כדי לא לגרום נזק קבוע במצב חולף.** בפועל כל החוקרים שבדקו זאת הראו שעבור הרוב הגדל הזה מצב חולף אפילו ללא טיפול, בתנאי שלא מקבעים מעבר חברתי או סירוס כימי שמקבעים ומסלימים דיספוריה.⁵
- 6. שאין שום דרך אלטרנטיבית וגישה לסייע** (כਮון שיש, פרטניות וקבוצתיות).⁶
- 7. שיש הבנה מלאה במה מדובר.** בקרב בני נוער אין את ההבשה המוחית המספקת כדי להבין את ההשלכות, ובנוגע לבוגרים כשפシיכיאור בריטי החליט לעשות קבוצת תמיכה מעורבת של לפני ואחרי ניתוח כריתת אברי מין, מתוך 100 משתתפים לפני הניתוח, כשהם הבינו לעומק мало שאחרי במה מדובר, ל-98% עבר החשך ורק 2 המשיכו...⁷

בקיצור 0 מהתנאים מתקיים



מקורות:

1 הממחקר הבוריי 4 מות�דים במצבר מתוך 15000 שנפנו למרפאת המادر לוגר על פני 11 שנים 2010-2020
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-022-02287-7>

2 הממחקר מפינלנד. התאבדויות מאז נידירות ב 25 שנים ואלפי נבדקים צעירים עם דיספוריה. בנוסף ברגע שעושים בקרה על הרקע הפסיכיאטרי, לא נמצא הבדל בהתאבדות בין צעירים בלבד ועם דיספוריה מה שמעלה את ההשערה שהאובדן הילולה של התחלואה הפסיכיאטרית הנלוות לדיספוריה.
<https://mentalhealth.bmj.com/content/27/1/e300940>

3 מחקר אמריקאי - אחרי הכריתה אצל גברים בשנותיהם הראשונות (פרק הזמן שנחקר) ההגעה לחדר המין בשל נסיבות אובדניות בפועל היא פי 2 מאשר לפני³
<https://www.auajournals.org/doi/10.1097/JU.0000000000001971.20>

המחקר השבדי - מחקר האורך היחיד שקיים כוון שבחן שאלה זו. מצא פי 19 התאבדויות בפועל בהשוואה לאוכלוסייה הכללית מספר שנים אחרי תהליכי הסירוסים והכריותן.
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0016885>

4 המחוקרים שבחנו זאת ממצאו שתחליני הסירוסים והכריות קשורים לקיצור משמעותית בתוחלת החיים מסיבות בריאותיות (בנוסף לאובדן)
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0016885>
[https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587\(21\)00185-6/abstract](https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(21)00185-6/abstract)

5 סקירה של המחוקרים שבוצעו בין 1972-2013
http://www.sexologytoday.org/2016/01/do-trans-kids-stay-trans-when-they-grow_99.html?m=1&fbclid=IwAR2jTNF4X2Ht0PNyOV3MifO371blzyh2c-tozKfxlQEBLU8a7Hs3G4_-RsA

אחרי שנערכה סקירה זו, נוסף מחקר שפורסם ב 2021 אשר מצא 88% החלה מהדיספוריה מגדרית בילדים
<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsy.2021.632784/full?fbclid>

ב 2024 התפרסם מחקר אורך הולנדי של 15 שנים שמצא שרצון להיות המין השני או תופעה לא נדירה, שמקורה לבטחון עצמי נמוך, ומצוות נפשיות, ושהחולפת עבורה הרוב עם הגיל
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-024-02817-5>

6 לדוגמא <https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-022-05832-4>

7 מופיע בספר Time to Think: The Inside Story of the Collapse of the Tavistock's Gender Service for Children. Barnes, H. (2023).

8 Steensma, T.D., McGuire, J.K., Kreukels, B.P., Beekman, A.J. & Cohen-Kettenis, P.T. (2013). Factors associated with desistence and persistence of childhood gender dysphoria: a quantitative follow-up study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 52 (6): 582-90

9 <https://publications.aap.org/pediatrics/article/150/2/e2021056082/186992/Gender-Identity-5-Years-After-Social-Transition>

10 [/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36593754/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36593754/)

11 Steensma, T. D., de Rooy, F. B. B., van der Meulen, I. S., Asseler, J. D., & van der Miesen, A. I. R. (2022, September 16–20). Transgender Care . Over the Years: First Long-Term Follow-Up Studies and Exploration of Sex Ratio in the Amsterdam Child and Adolescent Gender Clinic [Conference presentation]. World Professional Association for Transgender Health Symposium, Montreal, QC, Canada]

12 <https://link.springer.com/article/10.1007/s00192-024-05779-3>

